
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Purchased
1931
Septemb 1899
R. W. Gibson. Invt.

81.61
M86

TRAITÉ

DES

ARBRES & ARBRISSEAUX

TRAITÉ

DES

ARBRES & ARBRISSEAUX

FORESTIERS, INDUSTRIELS ET D'ORNEMENT

CULTIVÉS OU EXPLOITÉS EN EUROPE ET PLUS PARTICULIÈREMENT EN FRANCE

DONNANT LA DESCRIPTION ET L'UTILISATION DE PLUS DE 2400 ESPÈCES
ET 2000 VARIÉTÉS

PAR

P. MOUILLEFERT

Professeur de Sylviculture à l'École Nationale d'Agriculture de Grignon

---

ATLAS

Contenant 195 planches inédites dont :

11 D'ÉLÉMENTS DE BOTANIQUE DES ARBRES
144 PHOTOTYPIES DE PORT D'ARBRES
40 COLORIÉES DONNANT LES CARACTÈRES DE 55 ESPÈCES

PARIS
LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES
PAUL KLINCKSIECK, ÉDITEUR
52, rue des Écoles, 52

1892-1898

487
.M68
v.3

TABLE DES PLANCHES[1]

1° Planches noires d'éléments de Botanique des Arbres.

Planches.	Page du texte.
A. — Eléments anatomiques des arbres	69
B. — Structure du bois	69
C. — Différentes sortes de bourgeons	70
D. — Formes de feuilles simples	70
E. — » » composées	70
F. — Inflorescences diverses	70
G. — » diverses (suite)	71
H — Formes de fleurs et parties de la fleur	71
I. — Fruits divers	71
J. — » » (suite)	71
K. — » » (suite)	72

2° Phototypies de port d'Arbres, par ordre alphabétique

Planches.	Page du texte	Planches.	Page de texte.
133 Abies cephalonica	1250	65 Æsculus flava	715
132 — pinsapo	1259	63 — Hippocastanum	710
60 Acacia falcata	678	64 — rubicunda	713
61 — horrida	681	6 Ailantus glandulosa	219
59 — longissima	679	19 Amygdalus communis	388
58 — melanoxylon	677	20 — persicoïdes	391
67 Acer campestre	733	101 Alnus cordifolia	1131
66 — Pseudoplatanus	729	100 — glutinosa	1127

(1) Les 11 planches noires d'éléments de la botanique des arbres sont désignées par A à K ;

Les 144 phototypies par les N°s 1 à 144 ;

Les 40 planches coloriées sont numérotées et doivent être reliées comme suit : I à XXVI, XXVI *bis*, XXVI *ter*, XXVII, XXVII *bis*, XXVII *ter*, XXVIII, XXVIII *bis*, XXVIII *ter*, XXIX, XXIX *bis*, XXX, XXXI, XXXII, XXXII *bis*.

L'Éditeur.

Planches.		Page du texte.
79	Aralia dactylifolia	879
78	— Humboldtiana	879
79	— Schæffleri	879
141	Araucaria brasiliensis	1329
140	— excelsa	1330
96	Arbutus andrachne	1038
97	— unedo	1037
23	Armeniaca sativa	409
99	Betula verrucosa	1117
72	Buxus sempervirens	810
17	Callistemon lanceolatus	336
18	— speciosus	336
103	Carpinus betulus	1135
108	Castanea vulgaris	1149
9	Cedrela sinensis	252
135	Cedrus libani. var. Atlantica	1292
127	Celtis occidentalis	1208
128	— crassifolia	1209
26	Cerasus acida var	441
25	— avium	437
27	— Mahaleb	448
56	Ceratonia siliqua	662
55	Cercis siliquastrum	661
7	Citrus aurantium	228
8	— limonium	240
5	Cocculus laurifolius	176
80	Cornus mas	885
104	Corylus colurna	1141
37	Cotoneaster frigida	487
35	Cratægus Azarolus	474
31	Cratægus Carrieri	466
29	— flava	461
33	— linearis	468
32	— lucida *(crus-galli)*	467
30	— Mexicana Grignonensis	463
36	— monogyna	479
34	— nigra	471
90	Diospyros Kaki	968
91	— — var. costata	969
89	— Virginiana lucida	467
48	Eriobothrya japonica	537
12	Eucalyptus globulus	296
13	— viminalis	298
105	Fagus sylvatica	1145
106	— — asplenifolia	1147
107	— — pendula	1147
129	Ficus carica fructu albo	1222
130	— — — rubro	1224
94	Fraxinus excelsior	984
54	Gleditschia triacanthos var. inermis	652
62	Grevillea robusta (arbre de droite)	1060
57	Gymnocladus canadensis	228
70	Hovenia dulcis	774
71	Ilex aquifolium	776
122	Juglans hybrida *(intermedia)*	1188
123	— nigra	1188
144	Libocedrus decurrens	1349
95	Ligustrum lucidum	977
4	Liriodendron tulipifera	128
1	Magnolia grandiflora	110
2	— macrophylla	115
3	— Yulan (*conspicua*)	117
43	Malus communis	516
44	— spectabilis	523
16	Melaleuca cuticularis	336
14	— decussata	334
15	— Huegeli	336
10	Melia Azedarach	256
28	Mespilus Smithii	459
88	Myoporum pictum	942
81	Nyssa sylvatica	891
92	Olea Europea (très âgé)	971
93	— — forêt	971
77	Opuntia ficus indica	872
102	Ostrya carpinifolia	1134
87	Paulownia imperialis	940
22	Persica Davidiana	407
21	— vulgaris	395
46	Photinia serrulata	431
47	— — rotundifolia	431
134	Picea excelsa	1265
138	Pinus canariensis	1319
136	— Laricio corsica	1301
137	— montana	1302
139	— strobus	1325
42	Pirus communis	503
126	Planera (*Zelkowa*) crenata	1204
131	Platanus orientalis, var. acerifolia	1226
83	Populus alba	1105
86	— canadensis (mascula)	1113

Planches.		Page du texte.
84	Populus canescens.	1107
85	— nigra.	1111
24	Prunus domestica	423
11	Punica granatum	261
115	Quercus Ægilops.	1173
119	— alba	1164
114	— cerris.	1171
113	— macrocarpa	1165
118	— occidentalis	1169
109	— pedunculata. . . .	1156
110	— — futaie.	1156
112	— pubescens.	1158
111	— robur.	1157
120	— rubra (massif) . . .	1176
116	— suber.	1168
117	— — forêt	1168
121	— tinctoria.	1177
68	Rhamnus catharticus. . . .	757
56	Robinia pseudoacacia. . . .	564
49	— — le plus ancien de France. . . .	564
82	Salix alba	1087
98	Sassafras officinalis	1069
62	Schinus molle (arbre de gauche)	703
142	Sequoïa gigantea.	1333
52	Sophora japonica	629
53	— pendula.	630
38	Sorbus aria obtusifolia. . .	492
39	— domestica	501
40	— hybrida très âgé. . .	498
41	— torminalis	497
73	Sterculia platanifolia	812
45	Stranvæsia glaucescens. . .	536
76	Tamarix gallica	837
143	Taxodium distichum	1352
75	Tilia argentea	820
74	— grandifolia	818
124	Ulmus campestris	1198
125	— montana	1200
69	Zizyphus vulgaris	764

3° Planches Coloriées

Nota. — Quelques noms de ces planches diffèrent de ceux de la présente table ; ces derniers seuls sont exacts.

Planches.		Page du texte.
XXXVI*ter*	Abies cephalonica. . .	1250
XXVI^{A}	— — var. robusta.	1250
XXVI*bis*	— Nordmanniana .	1249
XXVI^{B}	— pectinata	1247
XV^{B}	Æsculus turbinata (*Æ. chinensis*)	713
XV^{A}	— parviflora . .	717
XIII	Acacia cultriformis . .	676
XII	— dealbata. . . .	683
XIV^{A}	Acer colchicum. . . .	737
XIV^{B}	— Lobelii	737
XX	Alnus cordifolia. . . .	1131
III^{c}	Berberis Ætnensis. . .	151
III^{B}	— Thunbergii. .	157
III^{A}	— vulgaris . . .	144
XXI	Betula populifolia. . .	1119
XXIX	Biota orientalis	1347
XXII	Carpinus orientalis . .	1137
XVII	Catalpa Kæmpferi. . .	932
XXVII*ter*	Cedrus Libani	1291
XXV	Celtis occidentalis. . .	1208
XXX	Chamæcyparis Lawsoniana.	1342
I	Clematis Hakonensis var. Jackmani . .	85
VI^{A}	Cotoneaster frigida . .	487
VII^{B}	Cratægus crus-galli . .	467
VII^{A}	— Tanacetifolia	474
X	Desmodium penduliflorum	638
IV^{A}	Eucalyptus globulus. .	296
IV^{B}	— robusta . .	313
XVIII^{B}	Fraxinus dimorpha. .	988
XVIII^{A}	— ornus	992
XI	Gleditschia triacanthos	652
XXXI^{B}	Juniperus virginiana var. cinerascens . .	1363

Planches.		Page du texte.
XXXIA	Juniperus communis var. pendula . . .	1359
II	Magnolia purpurea var. Lennei.	120
VIIIA	Malus microcarpa var. coccinea.	527
VIIIB	Malus Kaïdo	524
XXIIB	Ostrya carpinifolia . .	1134
XXVII	Picea orientalis	1272
XXVIII*ter*	Pinus excelsa	1324
XXVIII	— Laricio var. austriaca.	1301
XXVIII*bis*	— montana var. uncinata.	1302
XIXA	Populus balsamea candicans (*vel ontariensis*).	1114
XIXB	Populus nigra	1111
VA	Prunus domestica . . .	423
VB	— brigantiaca . .	416
XXVII*bis*	Pseudotsuga Douglasii.	1281
VIB	Pyracantha europea. .	481
XXIII	Quercus Ægilops var. macrolepis	1174
XXIX*bis*	Sequoïa gigantea . . .	1333
IXB	Sorbus aria var. obtusifolia.	492
IXA	— hybrida	498
XVI	Tilia argentea.	820
XXXII	Taxus baccata var. Dovastoni	1365
XXXIII*bis*	Taxodium distichum .	1353
XXIV	Ulmus campestris var. Belgica.	1199

Explication des Planches coloriées

I

Clematis Hakonensis var. **Jackmani**.— 1. Rameaux avec fleurs et feuilles.—2. Androcée. — 3. Etamine grossie. —4. Capitule d'akènes. — 5. Akène isolé surmonté du style persistant ou queues. — 6. Coupe du même (Texte p. 85).

II

Magnolia purpurea var. **Lennei**. — 1, Feuilles et fleurs. —2, Etamine, face interne. — 3. Etamine face externe. — 4. Androcée, gynécée et réceptacle. — 5. Coupe des mêmes. — 6. Coupe longitudinale d'un carpelle. — 7. Syncarpe (fruit) montrant les follicules en déhiscence. — 8. Graine, coupe longitudinale. — 9. Graine entière (Texte, p. 120).

III

A. — Berberis vulgaris Lin. — A. grappe de fleurs.— A^1. Fleur isolée (Texte, p. 44).

B. Berberis Thunbergii. DC. — B. Rameau avec ses fruits. — B^1 et B^2. Coupes du fruit.— B^3. Graine grandeur naturelle. — B^4. Graine grossie (Texte, p. 157).

C. Berberis Ætnensis Presl. — C. Rameaux avec grappes de fruits. — C^1 et C^2. Coupes du fruit. — C^3. Graine grandeur naturelle. — C^4. Graine grossie (Texte, p. 151).

IV

A. — Eucalyptus globulus Labil. — A. Rameau avec feuilles et fleurs. — A^1. Coupe longitudinale de la fleur. — A^2. Etamine. — A^3. Coupe transversale de l'ovaire. — A^4. Fruit vu d'ensemble. —A^5. Graine fertile et stérile (Texte, p. 296).

B. Eucalyptus robusta Smith. — Glomérule de fruits (Texte, p. 313).

V

A. Prunus domestica var. **sylvestris.** — A. Rameau avec feuilles et fruits. — A. Coupe longitudinale du fruit — A^2. Coupe transversale du noyau. — A^3. Noyau entier de face (Texte, p. 423).

B. Prunus brigantiaca Vill. — B. Rameau avec fruit. — B^1. Coupe du fruit (Texte, p. 416.

VI

A. Cotoneaster frigida Lindl. — A. Corymbe de fleurs. — A^1. Fleur grossie. — A^2. Coupe en long de la fleur. — A^3. Corymbe de fruits. (Texte, p. 487).

B. Pyracantha (Cotoneaster) **coccinea** Rœm. — **B.** Fruits. — B^1. Coupe horizontale du fruit. — B^2, B^3. Graine grandeur naturelle et grossie (Texte, p. 481).

VII

A. — Cratægus tanacetifolia Pers. — A. Rameau avec fruits. — A^1. Coupe transversale du fruit (Texte, p. 475.

B. — Cratægus crus-galli. Lin. — B. Rameaux stérile et fructifère. — B^1. Coupe transversale du fruit. — B^2 et B^3. Graine grandeur naturelle et grossie (Texte, p. 467).

VIII

A. Malus microcarpa var. **coccinea** Carr. — A. Fruits. — A^1 et A^2. Coupes du fruit (Texte, p. 527).

B. Malus Kaïdo Sieb. et Zucc. *M. microcarpa* var. *Kaïdo* Carr. — B. Corymbe de fruits. — B^1, B^2. Coupes du fruit (Texte p. 524).

IX

A. Sorbus hybrida Lin. — A. Rameau avec fruits. — A^1. Coupe transversale du fruit. — A^2, A^3. Pépin grandeur naturelle et grossi (Texte, p. 498).

B. **Sorbus aria** var. **obtusifolia** DC. — Corymbe de fruits et feuilles. — B^1. Coupe transversale du fruit. — B^2, B^3. Pépin grandeur naturelle et grossi (Texte, p. 492).

X

Desmodium penduliflorum Oudem. — 1. Rameau florifère. — 2. Fleur isolée, — 3. Coupe de la fleur (Texte, p. 638).

XI

Gleditschia triacanthos Lin. — 1. Feuilles et épines. — 2. Gousse. — 3. Graine. — 4. Coupe de la graine (Texte, p. 651).

XII

Acacia dealbata Link. — 1. Rameau avec feuilles et fleurs. — 2. Capitule de fleurs grossi. — 3. Fleur isolée. — 4. Fleur en bouton. — 5. Gynécée. — 6. Gousse. — 7. Graine grandeur naturelle. — 8. Graine grossie, coupe (Texte, p. 683).

XIII

Acacia cultriformis Cunn. — 1. Rameau avec feuilles et fleurs. — 2. Feuille isolée. — 3. Capitule de fleur grossi. — 4. Fleur isolée. — 5. Sépale. — 6. Pétale. (Texte, p. 676).

XIV

A. Acer Colchicum Hartw. — A. Feuilles et fruits. — A^1. Fruit coupé (Texte, p. 737).

B. Acer Lobelii Ten. — B. Feuilles et fruits. — B^1. Coupe du fruit. — (Texte, page 737).

XV

A. Æsculus parviflora Walt. — A. Feuilles et inflorescence. — A^1. Fleur isolée. — A^2. Etamine. — A^3. Coupe de la fleur. — A^4. Gynécée (Texte, page 717).

B. **Æsculus chinensis** Bung. vel *Æ. turbinata* Bl. — B. Rameau défeuillé et bourgeon. — B^1. Fruit. — B. Coupe du fruit. — B^3. Graine (Texte, page 713).

XVI

Tilia argentea Desf. — 1. Rameau avec feuilles et fleurs en bouton. — 2. Fleur épanouie. — 3. Coupe du fruit (Texte, p. 820).

XVII

Catalpa Kæmpferi Sieb. et Zucc. (Par erreur *C. Bungei*). — Rameau avec feuilles et fleurs. — 2. Fleur isolée. — 3. Coupe de la fleur. — 4. Anthères. — 4 *bis*. Style. — 5. Fruit raccourci. — 6 et 7. Coupe du fruit. — 8 et 9. Graine. — 10. Profil de la graine (Texte, page 932).

XVIII

A. **Fraxinus Ornus** Lin. — A. Feuilles et thyrse de fleurs. — A^1. Fleur isolée. (Texte page 992).

B. **Fraxinus dimorpha** Coss.— Feuilles et fascicule de fruits. — B^1. Coupe du fruit (Texte, page 988).

XIX

A. **Populus balsamea** var. **Ontariensis** Desf. — A. Rameau et chatons femelles. — A^1. Feuille. — A^2. Bractée ou écaille des chatons. — A^3. Fleurs femelles.— A^4. Grappe de fruits. — A^5. Capsule isolée (Texte, page 1114.).

B. **Populus nigra** Lin. — 1. Fleur mâle (Texte, p. 1111).

XX

Alnus cordifolia Ten. — 1. Châtons mâles. — 2. Cônes de fruits, chatons mâles et feuilles. — 3 et 4. Fleur mâle. — 5. Fleur femelle. — 6. Coupe du fruit. — 7. Ecaille du cône avec ses deux fruits. — 8. Fruit isolé (Texte, p. 1131).

XXI

Betula populifolia March. — 1. Chaton mâle. — 2. Jeune chaton femelle. — 3. Rameau, feuille et cônes de fruits. — 4 et 5. Fleur mâle. — 6 et 7. Fleur femelle. — 8 et 9. Fruit avec son écaille. — 10. Samare (Texte, p. 1119).

XXII

Carpinus orientalis Link. — A. Feuilles et fruits. — A^1. Fruit avec sa cupule. — A^2. Fruit isolé. — A^3. Fruit, coupe longitudinale (Texte, p. 1137).

Ostrya carpinifolia Scop. — B. Feuilles, fruits et jeunes chatons mâles. — B^1 Bhaton mâles épanouis. — B^2. Fleur mâle complète. — B^3. Etamine. — B^4. Bourgeons. — B^5. Fruit dans sa cupule et isolé. (Texte, p. 1134).

XXIII

Quercus Ægilops var. **macrolepis** Boiss.— 1. Rameau avec chaton mâle.— 2. Rameau et gland. — 3. Fleur mâle isolée. — 4. Fleur femelle. — 5. Coupe du gland (Texte, page 1174).

XXIV

Ulmus campestris Var. **Belgica** (par erreur *Ul. americana*). — 1. Rameau avec fleurs. — 2. Feuilles et fascicules de fruits. — 3. Fleur complète. — 4. Gynécée. — 5. Fruit isolé (Texte, p. 1200).

XXV

Celtis occidentalis Lin. — A. Rameau florifère. — B. Feuilles et fruit mûr. — 1. Fleur complète. — 2. Anthères. — 3. Pistil. — 4. Fruit coupé. — 5-6. Jeune fruit (Texte, p. 1208).

XXVI

A. **Abies cephalonica** var. **robusta** Carr. (par erreur *A. Numidica*). — A. Rameau avec cônes. — A^1. Ecaille et bractée. — A^2. Ecaille avec graine. — A^3. Graine isolée. — A^4. Coupe de graine (Texte, p. 1251).

B. **Abies pectinata** DC. — B^1, B^2. chatons mâles. — B^3. Anthère non encore ouverte. — B^4. Jeune chaton femelle. — B^5. Fleur femelle isolée (Texte, p. 1247).

XXVI *bis*

Abies Nordmanniana Spach. — 1. Rameau avec cône. — 2. Jeunes châtons mâles. — 3, 4. Anthère. — 5. Jeune cône ou châton femelle. — 6. Fleur femelle. — 7. La même vue en dessous. — 8. Ecaille et bractée. — 9. Graines sur leur écaille. — 10. Feuille grossie (Texte, p. 1219).

XXVI *ter*

Abies cephalonica Link. — 1. Rameau avec cône. — 2. Chatons mâles. — 3. Chaton mâle isolé. — 4. Anthère avec son connectif. — 5. Ecaille et bractée. — 6. Graine. — 7. Feuille isolée (Texte, p. 1230).

XXVII

Picea orientalis Carr. — 1. Rameau et chatons mâles. — 2. Rameau et chaton femelle — 3 et 4. Anthère. — 5. Ecaille et bractée. — 6. Fleurs femelles. — 7. Cône un peu avant maturité. — 8. Graine sur son écaille. — 9. Graines. — 10. Coupe longitudinale de la graine (Texte, p. 1272).

XXVII *bis*

Pseudotsuga Douglasii Carr. — 1. Ramule avec cônes. — 2. Ramule avec jeunes chatons mâle et femelle. — 3. Anthère non ouverte. — 4 et 5. Fleur femelle. — 6. Ecaille et bractée vues en dessous. — 7. Graine. — 8. Feuille isolée (Texte, p. 1281).

XXVII *ter*

Cedrus Libani Barr. — 1. Ramule avec cône. — 2. Chaton mâle non épanoui. — 3 et 4. Anthère. — 5. Graines sur leur écailles. — 6. Graine isolée. — 7. Feuille isolée (Texte, p. 1289).

XXVIII

Pinus Laricio var. **austriaca** Loud. — 1. Rameau avec cône mûr, cône d'un an, chatons mâle et femelle. — 2. Chaton mâle isolé. — 3. Anthère. — 4. Inflorescence femelle. — 5. 6. Fleur femelle isolée. — 7. Ecaille fructifère, vue en dessous. — 8. La même, avec ses deux graines. — 9. Graine isolée. — 10. Coupe longitudinale de la graine (Texte p. 1301).

XXXVIII *bis*

Pinus montana var. **uncinata** Hakeuk. — 1. Rameau avec : *a.* Cônes mûrs, *b.* Cônes d'un an, *c.* Inflorescence femelle terminale, *d.* Chatons mâles groupés. — 2. Anthère non ouverte. — 3. 4. La même après déhiscence. — 5. Grain de pollen. — 6. Inflorescence femelle grossie. — 7. Bractée et écaille avec les 2 ovules o' 0^1. — 8. Jeune écaille vue de dos. — 9. Ecaille mûre avec 2 graines. — 10. Ecaille isolée avec son mucron. — 11. Graine. — 12. Feuilles isolées (Texte p. 1302).

XXVIII *ter*

Pinus excelsa Wall. — 1. Rameau avec feuille et cônes, *a.* cône mûr, *b.* jeune cône d'un an. — 2. Inflorescence mâle. — 3. Anthère. — 4. Inflorescence femelle. — 5. Bractée avec ses deux ovules. — 6. La même, vue de dos. — 7. Ecailles de cône mûre. — 8. Graine isolée (Texte, p. 1324).

XXXI

Biota orientalis Endl. — 1. Rameau avec fruits mûrs. — 2. Extrémité grossie d'une pousse. — 3. Fleur mâle non épanouie. — 4. Bractée ovulifère. — 5. Strobile mûr isolé. — 6. Coupe du strobile. — 7. Ecaille avec deux graines (Texte, p. 1347).

XXIX *bis*

Sequoia gigantea Endl. — 1. Rameau avec strobile développé. — 2. Ecaille du strobile avec ses graines. — 3 et 4. Graine grandeur naturelle et grossie. — 5. Inflorescence mâle. — 6, 7, 8. Anthères avec quatre loges anthérifères vues dans différentes positions — 9. Feuille grossie (Texte p. 1333).

XXX

Cupressus (*Chamaecyparis*) **Lawsoniana** Murr. — 1. Rameau avec fruits mûrs. — 2. Ramule avec inflorescences mâles et feuilles aux extrémités. — 3. Inflorescence mâle grossie. — 4 et 5. Anthères avec son connectif pelté et ses loges anthérifères. — 6 et 7. Fleurs femelles. — 8. Strobile mûr. — 9. Ecaille avec ses graines (Texte, p. 1342).

XXXI

A. **Juniperus communis** Lin. var. **pendula** (par erreur *J. vulgaris* var. *reflexa*). — A. Rameau avec fruit mûr et non mûrs. — A¹ Coupe transversale du fruit (Texte, p. 1358).

B. **Juniperus virginiana** L. var. **Cinerascens** — B. Rameau avec fruits. — 2. B¹ Extrémité d'une pousse avec inflorescence — C² Fleur femelle à l'extrémité d'une pousse. — C³ Coupe longitudinale du fruit (Texte, p. 1358).

XXXII

Taxus baccata var. **Dovastoni** Carr. — 1. Ramule avec inflorescences mâles et femelles. — 2. Rameau avec fruit à différents degrés de développement. — 3. Chaton mâle. — 4. Le même, coupé. — 5. Etamine avec ses loges anthérifères. — 6 et 7. Fleur femelle. — 8. Fruit isolé. — 9. Coupe du fruit. — 10. Graine grandeur naturelle et grossie (Texte, p. 1365).

XXXII *bis*

Taxodium distichum Rich. — 1. Rameau avec : *a*, Fruit développé ; *b*, Inflorescences mâles. — 2. Strobiles mûrs. — 3. Coupe du même. — 4. Ecaille avec ses graines. — 5. Graine isolée. — 6 et 7. Feuille grandeur naturelle et grossie (Texte, p. 1353).


E
F
G
H
a
b
Q
R
S
I
a
b
J
K
A
B
C
D
a
L
a
N
4
5
6
8
M
T
c
O
a
b
7
3
2
P
1
U
U1
a b c d e f g h i k l m n o
V
a b c d e f g h i k l m n o


g
p
if
st
t
g
p
r
b
m
b
p
B
A
fe
ic
b
p
m
p
b
ic
n n n
B 1
p
if
C
3
2
1
E
s p l p l p l m c c f v f v b v l m
D
m
1
2
G
3
4
c
l
s
c
l
s
a
b
D
F


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ep
h
p
p
v
l
pc
pc
st
ep
11

1
4
15
6
3
2
5
13
12
7
10
11
9
8
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
8
4
2
9
5
6
7


1
2
3
4
5
6
7
8
8a
8b
9
9a
9b


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
a
b
b
b
a
p
r
n
sc
c


1
2
2a
3
3a
3b
3c
4
4a
4b
5
5a
6
7
7a
8
8a
9
9a
10
10a
11
11a


1a
1
2
2a
3a
3
4a
4
5
6a
6
7a
7
9a
9
8a
8
11
11a
10a
10


1b
2a
2b
2
3
7a
5a
7
5
1
1a
4
9a
9
8a
6
8
8a
4a

Clématite de Jackman. Clematis Jackmanii.

Magnolia pourpre var. de Lenné. Magnolia purpurea Curt. var. Lennei.

A. Épine-vinette commune. Berberis vulgaris.
B. Épine-vinette de Thunberg. Berberis Thunbergii DC
C. Épine-vinette de l'Ætna. Berberis Ætnensis Presl.

A. Eucalyptus globuleux. Eucalyptus globulus. Labill.
B. Eucalyptus robuste. Eucalyptus robusta Smith.

A. Prunier domestique. Prunus domestica L.
B. Prunier de Briançon. Prunus brigantiaca Vill.

A. Cotonéaster des neiges. Cotoneaster frigida Lindl.
B. Buisson ardent d'Europe. Cotoneaster pyracantha Sp

A. Aubépine à feuilles de Tanaisie. Cratægus tanacetifolia Pers

B. Aubépine Ergot-de-Coq. Cratægus crus-galli L

A. Pommier à petits fruits var. coccinè. Malus microcarpa var. coccinea Carr.

B. Pommier à petits fruits var kaïdo. Malus microcarpa var. kaïdo Carr.

A. Sorbier hybride. Sorbus hybrida L.

B. Alisier blanc à feuilles obtuses. Sorbus aria obtusifolia DC.

Desmodium à fleurs pendantes. Desmodium penduliflorum Oudem.

Févier à trois épines. Gleditschia triacanthos Lin.

Acacia blanchâtre. Acacia dealbata Link.

Acacia cultriforme. Acacia cultriformis Cunn.

A. Erable de la Colchide. Acer colchicum Hartw.
B. Erable de Lobel. Acer Lobelii Ten.

A. Marronnier à petites fleurs. Æsculus parviflora Walt.

B. Marronnier de la Chine. Æsculus chinensis Bunge.

Tilleul argenté. Tilia argentea Desf.

Catalpa de Bunge. Catalpa Bungei C.A.Mey.

A. Frêne à fleurs. Fraxinus ornus Lin.

B. Frêne dimorphe. Fraxinus dimorpha Coss.

A. Peuplier du lac Ontario. Populus Ontariensis. Desf.

B. Peuplier noir. Populus nigra. L.

Aune à feuilles cordiformes. Alnus cordifolia Ten.

Bouleau à feuilles de peuplier. Betula populifolia. Willd.

A. Charme d'Orient. Carpinus orientalis. Lmk.

B. Ostrya à feuilles de Charme. Ostrya carpinifolia. Scop.

Chêne à grosses écailles. Quercus macrolepis. Kotschy.

Orme d'Amérique. Ulmus americana. Willd.

Micocoulier d'Occident. Celtis occidentalis. L.

A. Sapin de Numidie. Abies Numidica de Lannoy.

B. Sapin pectiné. Abies pectinata DC.

Sapin de Nordmann. Abies Nordmanniana Spach.

Sapin de Céphalonie. Abies cephalonica Lmk.

Epicea d'Orient. Picea orientalis Carr.

Faux-Tsuga de Douglas. Pseudotsuga Douglasii Carr.

Cèdre du Liban. Cedrus Libani Barr.

Pin Laricio d'Autriche. Pinus Laricio austriaca Loud.

Pin de Montagnes, var. à crochets

Pinus montana. var. uncinata Hakenk.

Pin élevé. Pinus excelsa Wall.

Biota d'Orient. Biota orientalis Endl.

Sequoia géant. Sequoia gigantea Endl.

Cyprès de Lawson. Cupressus Lawsoniana Murr.

A. Genévrier commun, var. à rameaux réfléchis.

Juniperus vulgaris, var. reflexa.

B. Genévrier de Virginie. Juniperus virginiana L. var. cinerascens.

If commun var. de Dovaston. Taxus baccata Dovastonii. Carr.

Taxodium distique. Taxodium distichum Rich.

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MAGNOLIA A GRANDES FLEURS. — MAGNOLIA GRANDIFLORA. MICHX. FILS.

Hauteur 18 mètres. Tronc 1.80 de circonférence

PATRIE : ETATS-UNIS LAVALETTE, PRÈS MONTPELLIER 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

MAGNOLIA A GRANDES FEUILLES. — M. Macrophylla. Michx. fils

Hauteur 6 mètres. Tronc 0.60 de circonférence

PATRIE : États-Unis

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MAGNOLIA YULAN DESF. (M. CONSPICUA. SALISB.) — MAGNOLIA YULAN

Hauteur 8 mètres

PATRIE : CHINE

FEUILLES 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

TULIPIER DE VIRGINIE. — Liriodendron tulipifera. Lin

Hauteur 25 mètres. Tronc 3 mètres de circonférence.

PATRIE : Etats-Unis La Malmaison 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

COCCULUS A FEUILLES DE LAURIER. — Cocculus laurifolius. DC.

Hauteur 5 mètres.

PATRIE : Népaul PARC DE MONTE-CARLO 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

AILANTE GLANDULEUX (VERNIS DU JAPON). — AILANTUS GLANDULOSA. DESF

Hauteur 28 mètres. Tronc 3,20 de circonférence.

PATRIE : JAPON

BORDEAUX 1889

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris

Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ORANGER A FRUIT DOUX. — Citrus Aurantium. Lin.

Hauteur 11 mètres. Tronc 1.80 de circonférence

PATRIE : Chine

Collioure (Pyr.-Or.) 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Publ. KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CITRONNIER COMMUN. (MASSIF.) – CITRUS LIMONIUM. RIS & POIT.

Hauteur 4 à 5 mètres.

PATRIE. Chine Méridionale. MENTON 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CEDRELA DE LA CHINE. — CEDRELA SINENSIS. A. JUSS.

Hauteur 10 mètres. Tronc 0.80 de circonférence

PATRIE : CHINE

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE, PARIS 1887

Lap. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

LILAS DES INDES. — Melia azedarach. Lin

Hauteur 12 mètres. Tronc 1.20 de circonférence

PATRIE : Indes

Jardin Bot. Montpellier 1886

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

GRENADIER COMMUN. — PUNICA GRANATUM. LIN

Hauteur 4 mètres. Tronc, 0 60 de circonférence

PATRIE : RÉGION MÉDITERRANÉENNE

COLLIOURE 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

EUCALYPTUS GLOBULEUX. — EUCALYPTUS GLOBULUS. LABILL.

Hauteur 26 mètres. Tronc 3 mètres de circonférence

PATRIE : AUSTRALIE JARDIN D'ACCLIMATATION NICE 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

EUCALYPTUS VIMINAL — Eucalyptus viminalis. Labill

Hauteur 20 mètres. Tronc 1.70 de circonférence

PATRIE : Sud Est de l'Australie Jard. d'Acclimatation. Hyères 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MELALEUCA DÉCUSSÉ. — MELALEUCA DECUSSATA. R. BR.

Hauteur 7 mètres. Tronc 1.30 de circonférence

PATRIE : SUD-EST D'AUSTRALIE JARD. DE LA VILLE D'HYÈRES 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MELALEUCA D'HUEGEL. — Melaleuca Huegelii Mac. Owen.

Hauteur 12 mètres. Tronc 1,30 de circonférence

PATRIE : La Nouvelle Hollande

Jardin Botanique. Cape Town 1889

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris

MELALEUCA CUTICULAIRE. — MELALEUCA CUTICULARIS. HORT.

Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

Hauteur 5 et 7 mètres. Tronc 1.40 et 1.50 de circonférence

PATRIE : NOUVELLE HOLLANDE

JARD. BOTANIQUE. CAPE TOWN 1889

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CALLISTEMON LANCEOLÉ. — Callistemon lanceolatum. DC.

Hauteur 4 mètres

PATRIE : Australie

Jardin d'Acclimatation, Nice 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CALLISTEMON ÉLÉGANT. — Callistemon speciosum DC.

Hauteur 10 mètres. Tronc 1.20 de circonférence.

PATRIE : Nouvelle Hollande Cape Town 1889

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

AMANDIER COMMUN. — AMYGDALUS COMMUNIS. L.

Hauteur 12 mètres. Tronc 1,50 de circonférence

PATRIE : EUROPE GIRONDE 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

AMANDIER FAUX PÊCHER. — AMYGDALUS PERSICOÏDES. DECNE.

Hauteur 8.50. Tronc 0.80 de circonférence

ORIGINE : [illegible]

MUSEUM PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PÊCHER COMMUN. — Persica vulgaris. Mill.

Hauteur 7 mètres. Tronc 0.50 de circonférence

PATRIE : Chine

Gardonne Dordogne 1880

Imp. Phot. AHON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PÊCHER DE DAVID. — PERSICA DAVIDIANA. CARR.

Hauteur 6 mètres. Tronc 0.50 de circonférence

PATRIE : CHINE.

MUSEUM PARIS 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ABRICOTIER COMMUN. — Armeniaca Sativa. Lamk.

Hauteur 9 mètres. Tronc 1,20 de circonférence

PATRIE : Orient

Gardonne. Dordogne 1886

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

PRUNIER DOMESTIQUE. — PRUNUS DOMESTICA LIN.

Hauteur 4 mètres. Tronc 0 60 de circonférence

PATRIE : EUROPE ET ASIE GRIGNON, 1891

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CERISIER MERISIER. — CERASUS AVIUM MŒNCH.

Hauteur 10 mètres. Tronc 1.20 de circonférence

PATRIE : EUROPE ET ASIE

GRIGNON, 1891

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CERISIER ACIDE VAR. DE MONTMORENCY. CERASUS ACIDA GOERTN.

Hauteur 8 mètres; Tronc 1.40 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CERISIER MAHALEB (BOIS DE SAINTE-LUCIE). — CERASUS MAHALEB. MILL.

Hauteur 11 mètres. Tronc 1 mètre de circonférence

PATRIE. EUROPE Gris-Nez, 1889

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

NÉFLIER DE SMITH. — MESPILUS SMITHII DC.

Hauteur 7 mètres. Tronc 0.80 de circonférence

PATRIE : CAUCASE GRIGNON 1888

Imp, Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK éditeur à Paris

AUBÉPINE A FRUIT JAUNE.— CRATÆGUS FLAVA AIT.

Hauteur 9 mètres. Tronc 0.90 de circonférence

PATRIE : AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE MUSEUM PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur | Paris

AUBÉPINE DE MEXIQUE VAR. — CRATÆGUS MEXICANA. MOÇ. ET SESS VAR.

Hauteur 6 mètres. Tronc 0.60 de circonférence

PATRIE : MEXIQUE

GRIGNON. 1891

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

AUBÉPINE DE CARRIÈRE. — CRATÆGUS CARRIERI REV. HORT.

Hauteur 5 mètres. Tronc 0,40 de circonférence

PATRIE : ÉTATS-UNIS MUSEUM PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

AUBÉPINE A FEUILLES LUISANTES. — CRATÆGUS LUCIDA MILL.

Hauteur 6 mètres. Tronc 1.50 de circonférence

PATRIE : ETATS-UNIS

MUSEUM. PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

AUBÉPINE A FEUILLES LINÉAIRES. — CRATÆGUS LINEARIS. PERS.

Hauteur 5 mètres. Tronc 0.60 de circonférence

PATRIE : ÉTATS-UNIS MUSEUM PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

AUBÉPINE NOIRE. — Cratægus Nigra. Wald.

Hauteur 10 mètres. Tronc 1.10 de circonférence

PATRIE : Hongrie

Arboretum. Segrez 1880

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

AUBÉPINE AZEROLIER. — Cratægus azarolus. Lin.

Hauteur 8 mètres. Tronc 1 mètre de circonférence

Imp. Phot. AERON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

AUBÉPINE MONOGYNE VAR. PYRAMIDALE.— CRATÆGUS MONOGYNA JACQ. VAR. FASTIGIATA.

Hauteur 9 mètres. Tronc 0.90 de circonférence

PATRIE : EUROPE

SEGREZ, 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

COTONÉASTER DES NEIGES. — COTONEASTER FRIGIDA LINDL.

Hauteur 4 mètres. Age 18 ans

PATRIE : NÉPAUL ARBORETUM. CRIGNON 1889

Imp, Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK éditeur à Paris

ALISIER BLANC A FEUILLES OBTUSES. — SORBUS ARIA OBTUSIFOLIA D. C.

Hauteur 14 mètres, Tronc 1.40 de circonférence

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

SORBIER DOMESTIQUE. — SORBUS DOMESTICA LIN.

Hauteur 15 mètres. Tronc 2.70 de circonférence

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

SORBIER HYBRIDE. — SORBUS HYBRIDA LIN.

Hauteur 12 mètres. Tronc 1.65 de circonférence

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ALISIER TORMINAL. — SORBUS TORMINALIS CRANTZ.

Hauteur 19m. Tronc 1m50 de circonférence

PATRIE : EUROPE GRIGNON 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris.

Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

POIRIER COMMUN. — PIRUS COMMUNIS. LIN.

Hauteur 15m. Tronc 2m50 de circonférence

PATRIE : EUROPE

FEUCHEROLLES (S.-&-O.) 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

POMMIER COMMUN. — MALUS COMMUNIS LMK

Hauteur 10m. Tronc 1m60 de circonférence

PATRIE : EUROPE

GRIGNON 1891

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

POMMIER A BOUQUETS. — MALUS SPECTABILIS DESF

Hauteur 5m50. Tronc 0m60 de circonférence

PATRIE : CHINE MUSEUM. PARIS

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

STRANVÆSIA GLAUCESCENT. — S. GLAUCESCENS. LINDL.

Hauteur 6m. Tronc 0m80 de circonférence

PATRIE : ASIE

TOULON. SAINT-MANDIER 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

PHOTINIA SERRULÉ. — PHOTINIA SERRULATA LINDL.

Hauteur 7m. Tronc 1m10 de circonférence

PATRIE : CHINE SAINTE-FOY-LA-GRANDE 1886

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

PHOTINIA SERRULÉ VAR.A FEUILLES RONDES. - PHOTINIA SERRULATA. LINDL VAR.ROTUNDIFOLIA

Hauteur 6m.50 Tronc 1m de circonférence

PATRIE : CHINE TOULON (SAINT-MANDRIER) 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

NÉFLIER DU JAPON. — ERIOBOTRYA JAPONICA. LINDL.

Hauteur 7m. Tronc o^m80 de circonférence

PATRIE : CHINE & JAPON MENTON 1888



Imp. Phot. ARON Frères, a Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ROBINIER FAUX ACACIA. — ROBINIA PSEUDO ACACIA LIN

(Premier individu introduit en 1601)

Hauteur 14m. Tronc 2m50 de circonférence

PATRIE : ÉTATS-UNIS

MUSEUM PARIS 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ROBINIER FAUX ACACIA. — ROBINIER PSEUDO ACACIA LIN.

Hauteur 24m. Tronc 3m de circonférence

PATRIE : ÉTATS-UNIS BOIS DE BOULOGNE 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CYTISE DES ALPES. — CYTISUS ALPINUS MILL.

Hauteur 8m. Tronc 1m20 de circonférence

PATRIE : EUROPE GRIGNON 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

SOPHORA DU JAPON. — SOPHORA JAPONICA LIN

Hauteur 25m. — Tronc 3m de circonférence

PATRIE : CHINE ET JAPON

MUSÉUM DE PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, r. Turgot

Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

SOPHORA DU JAPON PLEUREUR.— SOPHORA JAPONICA VAR. PENDULA HORT.

Hauteur 6m.50 Circonférence 1m

PATRIE : JAPON

ECOLE DE GRIGNON 1891

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

FÉVIER A TROIS ÉPINES. — GLEDITSCHIA TRIACANTHOS LIN.

Hauteur 22m. — Tronc 2m30 de circonférence

PATRIE : ÉTATS-UNIS ARBORETUM GRIGNON 1891

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

GAINIER ARBRE DE JUDÉE. — CERCIS SILIQUASTRUM LIN.

Hauteur 12m. Tronc 1m10 de circonférence

PATRIE : RÉGION MÉDITERRANÉENNE

JARD. BOT. MONTPELLIER 1886

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CAROUBIERS COMMUNS. — CERATONIA SILIQUA. LIN.

Hauteur 12-15m. — Tronc 1m50 et 2m50 de circonférence

PATRIE : RÉGION MÉDITERRANÉENNE VILLEFRANCHE (ALPES-MARIT.) 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CHICOT DU CANADA.— GYMNOCLADUS CANADENSIS. LMK.

Hauteur 16m. Tronc 1m80 de circonférence

PATRIE : AMÉRIQUE SEPTENTRION. MUSÉUM DE PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ACACIA A BOIS NOIR. — A. MELANOXYLON R. BR.

Hauteur 10m. Tronc 1m10 de circonférence

PATRIE : AUSTRALIE MENTON 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ACACIA A LONGUES FEUILLES. — ACACIA LONGISSIMA WENDL.

Hauteur 8m. Tronc 1m de circonférence

PATRIE : AUSTRALIE

NICE 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ACACIA FALCIFORME. — ACACIA FALCATA WILLD.

Hauteur 15m. Tronc 1m10 de circonférence

PATRIE : AUSTRALIE

FUNCHAL, MADÈRE 1889

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ACACIA FÉROCE. — ACACIA HORRIDA WILLD.

Hauteur 9m. Tronc 0m80 de circonférence

PATRIE : CAP DE BONNE-ESPÉRANCE GOLFE JUAN 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MOLLÉ PLEUREUR.— SCHINUS MOLLE LIN.

Hauteur 7^m^. Tronc 1^m^30 de circonférence

PATRIE : CHILI, PÉROU MENTON (ALPES-MARIT.) 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, Éditeur à Paris

MARRONNIER D'INDE.— ÆSCULUS HIPPOCASTANUM LIN.

Hauteur 25m. Tronc 3m80 de circonférence

PATRIE : ASIE OCCIDENTALE

LAMOTHE-BEUVRON 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MARRONNIER ROUGE.— ÆSCULUS RUBICUNDA LOIS.

Hauteur 19m. Tronc 1m90 de circonférence

PATRIE : INCONNUE

MUSÉUM DE PARIS 1888

Imp. Phot. AUBON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

PAVIA À FLEURS JAUNES. — Æsculus (Pavia) flava Ait.

Hauteur 11m. Tronc 1m20 de circonférence

PATRIE : Etats-Unis

École de Grignon, Mai 1880

Imp Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ÉRABLE SYCOMORE. — Acer pseudoplatanus Lin.

Hauteur 19m. Tronc 2m de circonférence

PATRIE : Europe

École de Grignon, Mars 1891

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ÉRABLE CHAMPÊTRE. — ACER CAMPESTRE LIN.

Hauteur 16m. — Tronc 1m60 de circonférence.

PATRIE : EUROPE ÉCOLE DE GRIGNON, MAI 1889

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

NERPRUN PURGATIF. — RHAMNUS CATHARTICUS LIN.

Hauteur 7m50. Tronc 0m75 de circonférence

PATRIE : EUROPE

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

JUJUBIER COMMUN. — ZIZYPHUS VULGARIS LMK.

Hauteur 9m. Tronc 0m90 de Circonférence.

PATRIE : RÉG. MÉDITERR.

MUSÉUM DE PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

HOVÉNIA À FRUIT DOUX. — HOVENIA DULCIS THUNB.

Hauteur 12m. Tronc 1m10 de circonférence

PATRIE : JAPON

VILLA THURET (ALPES-MARITIMES) 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

HOUX COMMUN. — Ilex aquifolium Lin.

Hauteur 16m. Tronc 1m20 de circonférence

PATRIE : Europe

le Bousquet d'Orb (Hérault) 1887

Imp. Phot. ABDN Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

BUIS COMMUN. — BUXUS SEMPERVIRENS LIN.

Hauteur 8m. Tronc 0m70 de circonférence

PATRIE : EUROPE

MUSÉUM PARIS 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

STERCULIA À FEUILLES DE PLATANE. — STERCULIA PLATANIFOLIA LIN.

Hauteur 22m. Tronc 2m20 de circonférence

PATRIE : CHINE

JARD. BOTAN. DE MONTPELLIER 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

TILLEUL À GRANDES FEUILLES. — Tilia grandifolia. Ehrh.

Hauteur 23m. — Tronc 2m40 de circonférence.

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

TILLEUL ARGENTÉ. — Tilia argentea. DC.

Hauteur 16m. Tronc 1m80 de circonférence

PATRIE : Europe australe

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

TAMARIX DE FRANCE. — Tamarix gallica Lin.

Hauteur 10m. Tronc 1m20 de circonférence

PATRIE : Europe

Leucathe (Aude) 1887

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

FIGUIER DE BARBARIE. — OPONTIA FICUS INDICA. MILLER

Hauteur 5m. Tronc 1m50 de circonférence

PATRIE : AMÉRIQUE CENTRALE VILLA THURET (ANTIBES) 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ARALIA DE HUMBOLDT. — Aralia Humboldtiana Hort.

Hauteur 6m50. Cime 4m de diametre

PATRIE : Amérique tropicale Jardin de Monte-Carlo 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ARALIA DE SCHÆFFLER. — A. Schæffleri Spr.

Hauteur 3m50

PATRIE : Nouv. Zélande MONTE-CARLO 1888

A. À FEUILLES DIGITÉES. — A. dactylifolia Hort.

Hauteur 5m

PATRIE : Nouv. Zélande MONTE CARLO 1888

Imp. Phot. ARON Frères, à Paris. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CORNOUILLER MÂLE. — CORNUS MAS LIN.

Hauteur 12m. Tronc 1m20 de circonférence

PATRIE : EUROPE

ÉCOLE DE GRIGNON, MARS 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

TUPÉLO DES FORÊTS. — NYSSA SYLVATICA MARSHALL.

Hauteur 12m. Tronc 1m20 de circonférence.

PATRIE : ETATS-UNIS

PÉPINIÈRE DE LA MUETTE 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

SAULE BLANC. — SALIX ALBA L.

Hauteur 24m. Tronc 2m60 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

MUSÉUM DE PARIS 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PEUPLIER BLANC — POPULUS ALBA L.

Hauteur 32m. Tronc 4m de circonférence.

PATRIE : EUROPE STE-FOY-LA-GRANDE (GIRONDE) 1886

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PEUPLIER GRISARD. — Populus canescens Smith.

Hauteur 28m. Tronc 2m50 de circonférence.

PATRIE : Europe.

Grignon, 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PEUPLIER NOIR. — POPULUS NIGRA L.

Hauteur 28m. Tronc 3m de circonférence.

PATRIE : EUROPE

RIVESALTES (PYR. ORIENT.), JANVIER 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PEUPLIER DU CANADA (MÂLE). — POPULUS CANADENSIS (MASCULA) MICHX.

Hauteur 30m. Tronc 4m de circonférence.

PATRIE : ETATS-UNIS

LAVALETTE (HÉRAULT) 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PAULOWNIA MAJESTUEUX. — PAULOWNIA IMPERIALIS SIEB.

Hauteur 18m. Tronc 3m de circonférence.

(planté en 1834)

PATRIE : JAPON

MUSÉUM DE PARIS 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MYOPORUM ORNÉ. — MYOPORUM PICTUM (R. BR.)

Hauteur 9m.

PATRIE : AUSTRALIE

PARC DE MONTE CARLO, MARS 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

DIOSPYROS VIRGINIANA (L.) VAR. LUCIDA.

Hauteur 13m. Tronc 1m50 de circonférence.

PATRIE : VIRGINIE

CHEZ M. SAHUT, A LATTES, MONTPELLIER, [illegible]

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PLAQUEMINIER KAKI. — DIOSPYROS KAKI LIN.

Hauteur 5m. Tronc 0m80 de circonférence.

PATRIE : JAPON

JARD. D'ACCLIM. HYÈRES, MARS 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PLAQUEMINIER A CÔTES. — DIOSPYROS COSTATA (HORT.).

Hauteur 5m.

PATRIE : JAPON

CHEZ M. SAHUT, MONTPELLIER, JANVIER 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

OLIVIER D'EUROPE. — Olea Europæa Lin.

Hauteur 12m. Tronc 9m de circonférence.

PATRIE : Rég. Méditerr. Jardin des Oliviers, près de Jérusalem 1892

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

OLIVIER D'EUROPE. — Olea Europæa Lin.

Hauteur 16-17m. Tronc 4 à 5m de circonférence.

PATRIE : Rég. Méditerr. Cap Martin, près Menton, Mars 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

FRÊNE COMMUN. — FRAXINUS EXCELSIOR LIN.

Hauteur 28m. Tronc 3m30 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

GRIGNON, 1889

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

TROËNE LUISANT. — LIGUSTRUM LUCIDUM AITON.

Hauteur 12m. Tronc 1m50 de circonférence.

PATRIE : CHINE

JARDIN DENIS, HYÈRES, MARS 1886

Phototypie J. ROYER, Nancy.

Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ARBOUSIER ANDRACHNÉ. — ARBUTUS ANDRACHNE LAMK.

Hauteur 5m. Tronc 0m60 de circonférence.

PATRIE : ASIE-MINEURE

JARD. DE M. SAHUT A LATTES, JANVIER 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ARBOUSIER COMMUN. — ARBUTUS UNEDO LIN.

Hauteur 8m. Tronc 0m80 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

LATTES, PRÈS MONTPELLIER, CHEZ M. SAHUT.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

SASSAFRAS OFFICINAL. — SASSAFRAS OFFICINALIS NEES.

Hauteur 11m. Tronc 1m80 de circonférence.

PATRIE : AMÉRIQUE DU NORD

PÉPINIÈRES DE LA MUETTE (PARIS) MARS 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

BOULEAU VERRUQUEUX. — Betula verrucosa Ehrh.

Hauteur 20m. Tronc 1m de circonférence.

PATRIE : Europe

Grignon, Mai 1889

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

AUNE GLUTINEUX. — ALNUS GLUTINOSA GŒRTN.

Hauteur 20m. Tronc 1m60 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

CHATEAU-CHINON, 1891

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

AUNE A FEUILLES CORDÉES. — ALNUS CORDIFOLIA TEN.

Hauteur 22m. Tronc 1m70 de circonférence.

PATRIE : RÉGION MÉDITERRANÉENNE PARC RAMBOUILLET, 1886

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

OSTRYA A FEUILLES DE CHARME. — OSTRYA CARPINIFOLIA SCOP.

Hauteur 17m. Tronc 1m30 de circonférence.

PATRIE : EUROPE MÉRIDIONALE

NICE, 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHARME COMMUN. — CARPINUS BETULUS L.

Hauteur 17m. Tronc 1m70 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

GRIGNON 1889

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

NOISETIER DE TURQUIE. — CORYLUS COLURNA LIN.

Hauteur 14 m. Tronc 1m20 de circonférence.

PATRIE : EUROPE S.-E. MUSEUM, PARIS, 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

HÊTRE COMMUN. — FAGUS SYLVATICA LIN.

Hauteur 25m. Tronc 2m80 de circonférence.

PATRIE : EUROPE GRIGNON, FÉVRIER 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

HÊTRE COMMUN A FEUILLES LACINIÉES. -- FAGUS SYLVATICA ASPLENIFOLIA HORT.

Hauteur 14m. Tronc 1m90 de circonférence.

PATRIE : EUROPE TRIANON, AVRIL 1886

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

HÊTRE COMMUN PLEUREUR. — FAGUS SYLVATICA PENDULA HORT.

Hauteur 12m. Tronc 1m80 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

SEGREZ, OCTOBRE 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHATAIGNIER COMMUN. — CASTANEA VULGARIS LIN.

Hauteur 16m. Tronc 4m de circonférence.

PATRIE : EUROPE FEUCHEROLLES (S.-O), 1886

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE PÉDONCULÉ. — QUERCUS PEDUNCULATA EHRH.

Hauteur 22m. Tronc 2m40 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

GRIGNON, 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE PÉDONCULÉ. — QUERCUS PEDUNCULATA EHRH.

Futaie de 80 ans.

PATRIE : EUROPE

FORÊT DE MARLY, MARS 1866

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE ROUVRE. — QUERCUS ROBUR MILL.

Hauteur 25m. Tronc 2m70 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

FORÊT DE MARLY, MARS 1886

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE PUBESCENT. — QUERCUS PUBESCENS WILLD.

Hauteur 18m. Tronc 1m80 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

GRANDEUR DE L'ÉPREUVE 1/80

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CHÊNE A GROS FRUIT. — QUERCUS MACROCARPA MICHX.

Hauteur 14m. Tronc 1m60 de circonférence.

PATRIE : AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE

Phototypie J. ROYER, N

Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE CHEVELU. — QUERCUS CERRIS LIN.

Hauteur 17m. Tronc 1m70 de circonférence.

PATRIE : EUROPE

MUSÉUM, PARIS, 1888

Phototypie J. BOYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CHÊNE ÆGILOPS. — QUERCUS ÆGILOPS LIN.

Hauteur 12m. Tronc 1m80 de circonférence.

PATRIE : EUROPE AUSTRALE, ASIE MINEURE — St-MANDRIER PRÈS TOULON, 1888

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE LIÈGE. -- QUERCUS SUBER LIN.

Hauteur 22 m. Tronc 2m80 de circonférence.

PATRIE : RÉGION MÉDITERRANÉENNE ARGELÈS-S/-MER, JANVIER 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

FORÊT DE CHÊNE-LIÈGE. — QUERCUS SUBER LIN.

Hauteur 15 à 18m. Tronc 1m50 à 2m50 de circonférence.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE D'OCCIDENT. — QUERCUS OCCIDENTALIS GAY.

Hauteur 12m. Tronc 1m50 de circonférence.

PATRIE : EUROPE OCCIDENTALE UZA, LANDES, 1887

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE BLANC D'AMÉRIQUE. — QUERCUS ALBA LIN.

Hauteur 18-20m. — Tronc 1m50 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS LES BARRES, 1890

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE ROUGE. — QUERCUS RUBRA LIN.

Hauteur 18 - 20^{m}. — Tronc 1^{m}60 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS

PÉPINIÈRES DE LA MUETTE (PARIS), 1883

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

CHÊNE DES TEINTURIERS. — QUERCUS TINCTORIA MICHX.

Hauteur 17m. Tronc 1m10 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS. LES BARRES (LOIRET), 1890.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

NOYER HYBRIDE. — JUGLANS HYBRIDA HORT.

Hauteur 12m. — Tronc 1m50 de circonférence.

PATRIE : INCONNUE.

MUSÉUM, PARIS. MARS 1888.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

NOYER NOIR. — JUGLANS NIGRA LIN.

Hauteur 18m. Tronc 1m40 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS.

GRIGNON, MARS 1886.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ORME CHAMPÊTRE. — ULMUS CAMPESTRIS LIN.

Hauteur 33m. — Tronc 5m40 de circonférence.

PATRIE : EUROPE.

GRIGNON, 1886.

Phototypie J. ROYER, Nancy Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

ORME DES MONTAGNES. — ULMUS MONTANA SMITH.

Hauteur 22m. — Tronc 2m20 de circonférence.

PATRIE : EUROPE.

GRIGNON, AVRIL 1888.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PLANÉRA CRÉNELÉ. — PLANERA CRENATA DESF.

Hauteur 22m. — Tronc 2m20 de circonférence.

PATRIE : CAUCASE. S'-MANDRIER, PRÈS TOULON, MARS 1889.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MICOCOULIER D'AMÉRIQUE. — CELTIS OCCIDENTALIS LIN.

Hauteur 20m. Tronc 1m80 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS. MUSÉUM, PARIS, MARS 1888.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

MICOCOULIER D'AMERIQUE A FEUILLES ÉPAISSES. — CELTIS OCCIDENTALIS V. CRASSIFOLIA GRAY.

Hauteur 15m. Tronc 1m40 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS.

MUSÉUM, PARIS, MARS 1888.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

FIGUIER COMMUN, VAR. A FRUIT BLANC. — FICUS CARICA L. VAR. FRUCTU ALBO.

Hauteur 8m. Tronc 2m de circonférence.

PATRIE : RÉGION MÉDITERRANÉENNE. SALCES, PYR.-OR., 1887.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

FIGUIER COMMUN, VAR. A FRUIT ROUGE. — FICUS CARICA L. VAR. FRUCTU RUBRO.

Hauteur 6m. Cime 30m de circonférence.

PATRIE : RÉGION MÉDITERRANÉENNE. ARGELÈS-SUR-MER. PYR.-OR., 1888.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PLATANE D'ORIENT, VAR. A FEUILLES D'ÉRABLE — PLATANUS ORIENTALIS VAR. ACERIFOLIA DC.

Hauteur 33^{m}. Tronc 5^{m} de circonférence.

PATRIE : ORIENT. ÉCOLE DE GRIGNON.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

SAPIN PINSAPO. — ABIES PINSAPO BOISS.

Hauteur 15m. Tronc 1m30 de circonférence.

PATRIE : AFRIQUE NORD ET ESPAGNE. TRIAN[illegible], MAI 1892.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

SAPIN DE CÉPHALONIE. — ABIES CEPHALONICA LINK.

Hauteur 15m. — Tronc 1m50 de circonférence.

PATRIE : ASIE MINEURE.

TRIANON, 1893.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

EPICEA COMMUN. — PICEA EXCELSA DC.

Hauteur [illegible]. — Tronc [illegible] de circonférence.

PATRIE : EUROPE. ÉCOLE DE GRIGNON, 1893.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

CÈDRE DU LIBAN VAR. DE L'ATLAS. — CEDRUS LIBANI VAR. ATLANTICA.

Hauteur 20 m. — Tronc [illegible] de circonférence.

PATRIE : ALGÉRIE.

LAVALETTE, PRÈS MONTPELLIER, 1887.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

PIN LARICIO DE CORSE. — PINUS LARICIO CORSICA POIRET.

Hauteur 24m. — Tronc 1m80 de circonférence.

PATRIE : CORSE. PARC DE TRIANON, 18[illegible]

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

PIN DE MONTAGNES. -- PINUS MONTANA MILL.

Hauteur 12m. Tronc 1m 80 de circonférence.

PATRIE : EUROPE.

CERDAGNE PRÈS MONTLOUIS, PYR. ORtes 1887.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PIN DES CANARIES. — PINUS CANARIENSIS CHR. SMITH.

Hauteur 18 m. Tronc 1 m 80 de circonférence.

PATRIE : GRANDES CANARIES. JARDIN BOTANIQUE DE CAPTOWN 1889.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

PIN WEYMOUTH. — PINUS STROBUS LIN.

Hauteur 28 m. Tronc 2 m 70 de circonférence.

PATRIE : ETATS-UNIS. PARC DE TRIANON 1886.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ARAUCARIA ÉLEVÉ. — ARAUCARIA EXCELSA R. Br.

Hauteur 25 m. Tronc 2 m 50 de circonférence.

PATRIE : ILE DE NORFOLK. HYÈRES (JARDIN DE LA VILLE) 1888.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

ARAUCARIA DU BRÉSIL. — ARAUCARIA BRASILIENSIS A. RICH.

Hauteur 12m. Tronc 1m70 de circonférence.

PATRIE : BRÉSIL. JARDIN DE LA VILLE D'HYÈRES, 1888.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

SÉQUOÏA GÉANT. — SEQUOÏA GIGANTEA DCNE.

Hauteur 20m. Tronc 4m de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS.

PARC DE TRIANON, 1894.

Phototypie J. ROYER, Nancy Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris

TAXODIUM DISTIQUE. — TAXODIUM DISTICHUM RICH.

Hauteur 17m. Tronc 1m70 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS.

PÉPINIÈRES DE LA MUETTE, PARIS. 1887.

Phototypie J. ROYER, Nancy. Paul KLINCKSIECK, éditeur à Paris.

LIBOCÈDRE DÉCURRENT. — LIBOCEDRUS DECURRENS TORR.

Hauteur 12m. Tronc 0m80 de circonférence.

PATRIE : ÉTATS-UNIS. JARDIN D'ACCLIMATION D'HYÈRES, 1888.

7248
1-K.

New York Botanical Garden Library
QK487 .M68 v.3 gen
Mouillefert, P./Traite des arbres & arbr
3 5185 00030 0044